

CANNA COCO

ГРАФИК ВЫРАЩИВАНИЯ



ОНЛАЙН
РУКОВОДСТВО
ПО
ВЫРАЩИВАНИЮ



| | ВЕГЕТАТИВНАЯ ФАЗА | | | | ГЕНЕРАТИВНАЯ ФАЗА | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | УКОРЕНЕНИЕ | I | II | | I | | | II | III | IV | |
| ДНИ И НЕДЕЛИ | Δ1-5 | Δ6-25 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 |
| СВЕТОВЫЕ ЧАСЫ | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дозировки в мл на 10л | | | | | | | | | | | |
| CANNA COCO A | 26 - 33 | 26 - 33 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 26 - 33 | 26 - 33 | |
| CANNA COCO B | 26 - 33 | 26 - 33 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 29 - 37 | 26 - 33 | 26 - 33 | |
| CANNA RHIZOTONIC | 40 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| CANNAZYM | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 - 50 * | 25 - 50 |
| CANNA BOOST | | | 20 ** | 20 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 | 20 - 40 |
| CANNA PK 13/14 | | | | | | | | 15 | | | |
| мС/см | | | | | | | | | | | |
| ЕС ВОДЫ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ЕС ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА | 1,4 - 1,8 | 1,4 - 1,8 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 1,6 - 2,0 | 2,0 - 2,5 | 1,4 - 1,8 | 1,4 - 1,8 | |
| ЕС ОБЩИЙ | 1,8 - 2,2 | 1,8 - 2,2 | 2,0 - 2,4 | 2,0 - 2,4 | 2,0 - 2,4 | 2,0 - 2,4 | 2,0 - 2,4 | 2,4 - 2,9 | 1,8 - 2,2 | 1,8 - 2,2 | 0,4 |

Данный график выращивания предназначен для растений, которые формируют цветы или плоды, начиная с недельного черенка или сеянца. Продолжительность каждой фазы может варьироваться в зависимости от вида.

- * Удвойте дозировку CANNAZYM до 50 мл/10 л, если повторно используете субстрат.
- ** Увеличьте CANNA BOOST максимум до 40 мл/ 10 л в период цветения для дополнительной силы.

Для более длительной стадии роста повторите рекомендованные дозировки из вегетативной фазы I (Δ6–25). Для более длительной стадии цветения повторите рекомендованные дозировки из генеративной фазы I (H3–H5). Добавьте CANNA PK 13/14 в период 3–4 недели до урожая.

Рекомендуемый уровень pH: 5,5 - 6,2.

